



Cladribine (2-CdA)

En el Centro Clínico es referido como cladribine (pronunciado en inglés: KLAD-rih-been).

Cómo Se Administra Intravenosamente (por una vena)

Mecanismo de Acción del Fármaco Cladribine bloquea una proteína que las células del cáncer necesitan para copiar el ADN. El ADN es el material genético de las células que es utilizado para formar nuevas células.

Efectos Secundarios

1. Los efectos sobre la médula ósea pueden incluir una disminución temporal de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos y las plaquetas disminuyen dentro de las 2 semanas posteriores al tratamiento y se recuperan dentro de las 4 ó 5 semanas posteriores.
2. Pueden ocurrir náusea leve, vómito, pérdida del apetito y diarrea durante las primeras 2 semanas de tratamiento.
3. Pueden ocurrir dolores de cabeza leves y fatiga durante las primeras 2 semanas de tratamiento y disminuir de allí en adelante.
4. Pueden ocurrir cambios en la función intestinal. Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea y estreñimiento.
5. Por lo general ocurre erupción leve de la piel durante las primeras 2 semanas de tratamiento.

Instrucciones Especiales

1. Tome medicamento para la náusea según se le indicó.
2. No tome aspirina o productos que contienen aspirina a menos que sean recetados por su médico. Éstos incluyen vitaminas, tratamientos herbales, gotas para la nariz, medicamentos para el resfriado, influenza (gripe), dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre del heno y alergias.

3. Llame a su médico o enfermera del NIH si:

- tiene una temperatura de 101.0 ° F (38.3 °C) en cualquier momento o tiene una temperatura de por lo menos 100.4 °F (38.0 °C) que dure 1 hora o que ocurra dos veces en un periodo de 24 horas
- tiene algún sangrado o magulladura fuera de lo común



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el Cáncer Borrador, Octubre de 1999; Aprobación, Febrero del 2001
Institutos Nacionales de Salud, Departamento de Enfermería del CC